

สารจาก

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

เนื่องจากมีการกล่าวถึง การให้วัคซีนเป็นสูตรแอสตร้าเซเนก้า + แอสตร้าเซเนก้า (AZ/AZ) ร่วมกับสูตรซิโนแวค + แอสตร้าเซเนก้า (S/AZ) ในบางกรณี เช่นในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อมาก

ในเขตสุขภาพที่ 1 เป็นพื้นที่ที่ควบคุมการติดเชื้อได้ระดับหนึ่ง และการให้ S/AZ ห่างกัน 3 อาทิตย์ ทำให้ภูมิคุ้มกัน ขึ้นได้ดีภายใน 5 อาทิตย์(หลังเข็มสอง 2 อาทิตย์)

ต่างจากสูตร AZ/AZ หลังเข็ม1 แม้ภูมิคุ้มกันขึ้นดีกว่า ซิโนแวค แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับป้องกัน สายพันธุ์เดลตา (delta) และกว่าจะได้เข็ม 2 ต้องห่างไปอีก 10-12 สัปดาห์ ดังนั้นกว่าภูมิคุ้มกันจะเพียงพอจะใช้เวลา 12-14 สัปดาห์(หลังเข็ม 2 ไป 2 สัปดาห์)

“ขณะที่สูตร S/AZ ใช้เวลาเพียง 5 สัปดาห์ (จากข้อมูลการศึกษาที่มีในขณะนี้ ระดับไม่ต่างกันกับ สูตร AZ/AZ) ภูมิคุ้มกันขึ้นได้เพียงพอในการป้องกัน ใกล้เคียงกับสูตร AZ/AZ และ Pfizer/Pfizer”

จึงขอให้ในเขตสุขภาพที่ 1 ให้แจ้ง คกก โรคติดต่อจังหวัด **ขอให้ใช้สูตร S/AZ เท่านั้น** ไม่มีให้เลือกในสูตรอื่นๆ และให้บริหารจัดการให้เพียงพอ ตามสัดส่วน

ส่วนในบุคลากร การฉีดเข็ม 3 ให้เลือกได้ระหว่าง

1. AZ ซึ่งมีอยู่แล้วฉีดได้เลย(บริหารให้เหมาะสม) หลังฉีด Sinovac เข็ม 2 ไปแล้วมากกว่า 1 เดือน เสนอให้ฉีดในคนที่มากกว่า 3 เดือน เป็นลำดับแรก เรียงลำดับไปตามความเสี่ยงและระยะเวลา
2. Pfizer ซึ่งวัคซีนจะมาปลายเดือนกรกฎาคม กว่าจะให้ฉีดได้ เป็นต้นเดือนสิงหาคม